

BENOMYL RAINBOW 50 WP

Fungicida Agrícola

POLVO MOJABLE – WP

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

BENOMYL..... 500 g/kg
methyl 1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-ylcarbamate de formulación a 20 ° C.

Ingredientes aditivos c.s.p. 1kg

Registro Nacional ICA No. 1519

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

CONTENIDO NETO: 50, 100, 250, 500 gr; 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 60, 100, 150, 200 kg.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222

Fax: 86-531-88875232

Website: www.rainbowchem.com

Importado y Distribuido por:

GRUPO CENAGRO S.A.S.

CL. 14 # 27 A-156 BL 10 BG. 2 KM 4 Parcelación Industrial Arroyohondo

Yumbo-Valle

Teléfono : 6959908

AGROSEIS DE COLOMBIA SAS ZOMAC

Calle 16 #15-78 barrio Centro

Teléfono: 3204920330

Email: 6agroseis@gmail.com

Granada, Meta.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

(Franja de color azul)

LEA COMPLETAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS”
“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”
“CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS”

Este fungicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y **“No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación”**.

Durante las aplicaciones terrestres **“Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas”** además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para pesticidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

“Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta”.

En caso de intoxicación oral enjuague la boca del paciente con agua. No induzca el vómito. **“En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”**.

No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente.

No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación de **BENOMYL RAINBOW 50 WP**, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar fuentes o cursos de agua con desechos o residuos de mezcla de **BENOMYL RAINBOW 50 WP**.

Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos o cursos de agua, casas, carreteras troncales o ecosistemas susceptibles.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE “FUNDA” Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de Aprobación ICA: [dd/mm/aaaa](#)



CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BENOMYL RAINBOW 50 WP es una molécula perteneciente al grupo de los benzimidazoles. Es un fungicida sistémico con translocación acropétala que posee efecto preventivo y curativo.

BENOMYL RAINBOW 50 WP es un fungicida sistémico de Traslocación acropétala para el control de enfermedades en tratamiento foliar. **BENOMYL RAINBOW 50 WP**, es absorbido por las hojas y la raíz; controla un amplio rango de enfermedades de origen fungoso. Se recomienda aplicarlo cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. El producto detiene el desarrollo del tubo germinativo, inhibe la multiplicación celular y el crecimiento del micelio e inhibe la formación del apresorio y finalmente el hongo muere. Posee acción sistémica local, con penetración sistémica translaminar, que ofrece una protección prolongada. Su acción antiesporulante reduce significativamente el potencial de reinfección, ya que interrumpe la formación de la pared celular del hongo, teniendo así actividad durante todos los estadios del ciclo biológico del hongo.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	PC*	PR*
Frijol	Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	350 a 400 g/ha En una sola aplicación	7 días	4 horas

P.C: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

BENOMYL RAINBOW 50 WP es un fungicida preventivo curativo, que se debe aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad. Rotar con fungicidas de diferente mecanismo de acción para evitar la aparición de cepas resistentes. Se recomienda una (1) sola aplicación por ciclo de cultivo. Debe incluirse el producto en programas de manejo integrado de enfermedades.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Se puede aplicar con los equipos terrestres y aéreos de uso común. Es importante asegurar buen cubrimiento de todo el follaje. Llenar el recipiente o tanque del equipo de aspersión hasta la mitad de su volumen, agregar la dosis de **BENOMYL RAINBOW 50 WP** agitar vigorosamente, completar el volumen y mantener la agitación. Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox. Volumen de aplicación 200 L/Ha.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos, se recomienda en caso de duda hacer un ensayo en pequeña escala para observar fitocompatibilidad. No tiene acción corrosiva sobre los equipos de aplicación. **BENOMYL RAINBOW 50 WP** no es compatible con productos de fuerte reacción alcalina. En presencia de humedad se descompone lentamente.

No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL: “El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

Banda azul

