

SECCION 2

## PROPINEB + CYMOXANIL RAINBOW 76 WP

**Fungicida agrícola**

**POLVO MOJABLE – WP**

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

**Ingrediente activo:**

**Propineb**.....700 g/Kg

*Polymeric zinc propylenebis(dithiocarbamate)*

**Cymoxanil**..... 60 g/Kg

*1-[(EZ)-2-cyano-2-methoxyiminoacetyl]-3-ethylurea*

**Ingredientes aditivos**.....c.s.p. 1 Kg

**Registro Nacional ICA No. 1382**

**Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.**

### CONTENIDO NETO:

**Fecha de Formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**No. de Lote:**

**Formulado por:**

**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.**

Binhai Economic Development Area,  
Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222

Website: www.rainbowchem.com

**Importado y distribuido por:**

**RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.**

Carrera 11A # 93 A 80, Oficina 305

Teléfono: 57-1-6235967

NIT: 900382571-7

Bogotá, D.C.



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO**

**CUIDADO**

*(Franja de color azul)*

SECCION 2

## PROPINEB + CYMOXANIL RAINBOW 76 WP

**Fungicida Agrícola**

**POLVO MOJABLE - WP**

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

#### Ingrediente activo:

**Propineb**.....700 g/Kg

*Polymeric zinc propylenebis(dithiocarbamate)*

**CYMOXANYL**..... 60 g/Kg

*1-[(EZ)-2-cyano-2-methoxyiminoacetyl]-3-ethylurea*

**Ingredientes aditivos**.....c.s.p. 1 Kg

Registro Nacional ICA No. 1382

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

### CONTENIDO NETO:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

#### Formulado por:

**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.**

Binhai Economic Development Area.

Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222

Website: www.rainbowchem.com

Importado y Distribuido por:



Calle 162 Np. 21 38 Piso 2.

Tel: 6740640

Fax: 6690177

Bogotá D.C. - Colombia



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO**

**CUIDADO**

*(Franja de color azul)*

SECCION 2

## PROPINEB + CYMOXANIL RAINBOW 76 WP

**Fungicida agrícola**

**POLVO MOJABLE – WP**

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

#### Ingrediente activo:

**Propineb**.....700 g/Kg

*Polymeric zinc propylenebis(dithiocarbamate)*

**Cymoxanil**..... 60 g/Kg

*1-[(EZ)-2-cyano-2-methoxyiminoacetyl]-3-ethylurea*

**Ingredientes aditivos**.....c.s.p. 1 Kg

**Registro Nacional ICA No. 1382**

**Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.**

### CONTENIDO NETO:

**Fecha de Formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**No. de Lote:**

#### Formulado por:

**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.**

Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222

Website: www.rainbowchem.com

#### Importado y distribuido por:

**RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.,**

Carrera 11A # 93 A 80, Oficina 305

Teléfono: 57-1-6235967

NIT: 900382571-7

Bogotá, D.C.



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO**

**CUIDADO**

*(Franja de color azul)*

SECCION 2

## PROPINEB + CYMOXANIL RAINBOW 76 WP

**Fungicida agrícola**

**POLVO MOJABLE – WP**

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

#### Ingrediente activo:

**Propineb**.....700 g/Kg

*Polymeric zinc propylenebis(dithiocarbamate)*

**Cymoxanil**..... 60 g/Kg

*1-[(EZ)-2-cyano-2-methoxyiminoacetyl]-3-ethyurea*

**Ingredientes aditivos**.....c.s.p. 1 Kg

**Registro Nacional ICA No. 1382**

**Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.**

### CONTENIDO NETO:

**Fecha de Formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**No. de Lote:**

#### Formulado por:

**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.**

Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222

Website: www.rainbowchem.com

**Importado y distribuido por:**



Calle 162 Np. 21-38 Piso 2.

Tel: 6740640

Fax: 6690177

Bogotá D.C. - Colombia



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO**

**CUIDADO**

*(Franja de color azul)*

# PROPINEB + CYMOXANIL RAINBOW 76 WP

**Fungicida agrícola**

**POLVO MOJABLE – WP**

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### Ingrediente activo:

**Propineb**.....700 g/Kg

*Polymeric zinc propylenebis(dithiocarbamate)*

**Cymoxanil**..... 60 g/Kg

*1-[(EZ)-2-cyano-2-methoxyiminoacetyl]-3-ethylurea*

**Ingredientes aditivos**.....c.s.p. 1 Kg

**Registro Nacional ICA No. 1382**

**Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.**

## CONTENIDO NETO:

**Fecha de Formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**No. de Lote:**

### Formulado por:

**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.**

Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222

Website: [www.rainbowchem.com](http://www.rainbowchem.com)

### Importado y distribuido por:


**DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.**

Km 1.5 Vía Chía - Cajicá.

Costado Occidental. Centro Empresarial OXUS Of. 206

Teléfono: 8622481

[gerenciacomercial@delmonteagro.com.co](mailto:gerenciacomercial@delmonteagro.com.co)



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO**

**CUIDADO**

*(Franja de color azul)*

## LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

**“NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”**  
**“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS”**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este fungicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y **“No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación”**.

Durante las aplicaciones terrestres **“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación”** además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para pesticidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

**“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”**, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

**“Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado”**

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA.**

Evite respirar polvo, vapor o aspersión del producto. Evite el contacto con la piel, ojos o ropa.

**Contacto con los ojos:** Lávelos con agua limpia por al menos 15 minutos hasta que la irritación disminuya. Consiga atención médica si la irritación persiste.

**Contacto con la piel:** Remueva la ropa y zapatos contaminados inmediatamente. Lave fuertemente con agua y jabón la zona afectada. Consiga atención médica.

**Inhalación:** Utilice equipo de protección respiratoria antes del rescate. Inmediatamente traslade la víctima a un lugar con aire fresco. Si la víctima no respira, dé respiración artificial; si respira dificultosamente, suminístrele oxígeno. Consiga atención médica.

**Ingestión:** No provocar el vómito. Enjuagarse la boca con abundante agua. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

No suministre cosas por vía oral a una persona inconsciente.

No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.



**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.**

## **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

**“Respetar las franjas de seguridad con relación a los cuerpos de agua”**

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación de **PROPINEB + CYMOXANIL RAINBOW 76 WP**, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con **PROPINEB + CYMOXANIL RAINBOW 76 WP** las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

**Manejo de desechos:** Inactive los residuos y desechos lavándolos con una solución de Hidróxido de Sodio (soda cáustica) al 5%, o con solución de Carbonato de Sodio de 7 a 10% de concentración.

Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

## **ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO**

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

**ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.**

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.**

Fecha de Aprobación ICA:



SECCION 3

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”**

**PROPINEB + CYMOXANIL RAINBOW 76 WP** es un fungicida protectante y curativo, desarrollado para el control de enfermedades causadas por hongos. Es un fungicida de doble acción, sistémico y de contacto, trabaja sobre la espora y la enfermedad. Su parte sistémica se absorbe rápidamente y no se lava después de una hora de aplicado.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	PC	PR
Papa	GOTA ( <i>Phytophthora infestans</i> )	1.5 Kg/ha	15 días	4 horas

**P.C: Periodo de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R: Periodo de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido.

**N.A.:** No aplica.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: PROPINEB + CYMOXANIL RAINBOW 76 WP** se puede aplicar en cualquier estado de desarrollo del cultivo, ofreciendo acción residual prolongada y su amplio espectro de acción. Protege por fuera y cura por dentro de la hoja, combate la enfermedad antes y después de establecida. No afecta la fotosíntesis por su coloración blanca. Su parte protectante se adhiere mejor a la hoja. No se acumula dentro de la planta, presentando una mejor dispersión en la hoja. En invierno presenta su máxima potencia. No mezclar con productos a base de calcio. No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

**EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:** Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 125 µm aprox.

**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:** Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

**INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:**

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

Banda color azul



# PROPINEB + CYMOXANIL RAINBOW 76 WP

**Fungicida agrícola**

**POLVO MOJABLE – WP**

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### Ingrediente activo:

**Propineb**.....700 g/Kg

*Polymeric zinc propylenebis(dithiocarbamate)*

**Cymoxanil**..... 60 g/Kg

*1-[(EZ)-2-cyano-2-methoxyiminoacetyl]-3-ethylurea*

**Ingredientes aditivos**.....c.s.p. 1 Kg

**Registro Nacional ICA No. 1382**

**Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.**

## CONTENIDO NETO:

**Fecha de Formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**No. de Lote:**

**Formulado por:**

**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.**

Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222

Website: [www.rainbowchem.com](http://www.rainbowchem.com)



**Importado y distribuido por:**

**DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.**

Km 1.5 Vía Chía - Cajicá.

Costado Occidental. Centro Empresarial OXUS Of. 206

Teléfono: 8622481

[gerenciacomercial@delmonteagro.com.co](mailto:gerenciacomercial@delmonteagro.com.co)

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO**

**CUIDADO**

*(Franja de color azul)*

SECCION 1

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**“NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”  
“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS”**

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012  
Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.**

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

**“Respetar las franjas de seguridad con relación a los cuerpos de agua”**

Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

**ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.**

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PÉRFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.**

Fecha de Aprobación ICA:



Banda color azul






**PROPINEB + CYMOXANIL RAINBOW 76 WP**  
**USO: FUNGICIDA DE USO AGRICOLA**



Nombre Ing. activos: **700 g/Kg**  
**Propineb**.....  
**Cymoxanil**..... **60 g/Kg**  
 Grupo químico: **Propineb: Carbamatos**  
**Cymoxanil: Cyanoacetamide oxime**  
 Tipo de formulación: Polvo Mojable - WP  
 No. Registro Nacional ICA: **1382**  
 Nombre químico: **Propineb**  
 Fórmula estructural:



IUPAC: *Polymeric zinc propylenebis(dithiocarbamate)*

Fórmula Empírica:  $C_5H_8N_2S_4Zn$

Nombre químico: **Cymoxanil**

Fórmula estructural:



IUPAC: *1-[(E)-2-cyano-2-methoxyiminocetyl]-3-ethyurea*.

Fórmula Empírica:  $C_7H_{10}N_4O_3$

Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto:  
 Envase plástico polietileno de alta densidad y bolsa metálica de aluminio.

A NOMBRE DE: **RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.**

Formulado por:

**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.**  
 Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong 262737,  
 China.  
 Tel.: 86-531-88875222  
 Website: [www.rainbowchem.com](http://www.rainbowchem.com)

Importado y distribuido por:

**agrocenro**  
 Colombia, S.A.S.  
 Calle 162 Np 21.38 Piso 2.  
 Tel: 6740640  
 Fax: 6690177  
 Bogotá D. C., Colombia

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA III**  
**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**  
**(Frajita de color azul pantone)**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"**

**PROPINEB + CYMOXANIL RAINBOW 76 WP** es un fungicida protectante y curativo, desarrollado para el control de enfermedades causadas por hongos. Es un fungicida de doble acción, sistémico y de contacto, trabaja sobre la espada y la enfermedad. Su parte sistémica se absorbe rápidamente y no se lava después de una hora de aplicado.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	P. C.	P. L. PR. G.
Papa	GOTA ( <i>Phytophthora infestans</i> )	1.5 Kg/ha	15 días	4 horas

**P. C.: Período de carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**PR: Período de reentrada:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: PROPINEB + CYMOXANIL RAINBOW 76 WP** se puede aplicar en cualquier estado de desarrollo del cultivo, ofreciendo acción residual prolongada y su amplio espectro de acción.

Protege por fuera y cura por dentro de la hoja, combate la enfermedad antes y después de establecida. No afecta la fotosíntesis por su coloración blanca. Su parte protectante se adhiere mejor a la hoja. No se acumula dentro de la planta, presentando una mejor dispersión en la hoja. En invierno presenta su máxima potencia.

No mezclar con productos a base de calcio.

No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

**EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA** Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 125 µm aprox.

**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:** Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

**INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".


2010  
 Frajita color azul Pantone

# PROPINEB + CYMOXANIL RAINBOW 76 WP

USO: FUNGICIDA DE USO AGRICOLA

**Rainbow**  
with azoxystrobin granulating

Nombre Ing. activos: ..... 700 g/Kg  
Propineb ..... 60 g/Kg  
Cymoxanil .....  
Grupo químico: Propineb: Carbamatos  
Cymoxanil: Cyanoacetamide oxime  
Tipo de formulación: Polvo Mojable - WP  
No. Registro Nacional ICA: 1382  
Nombre químico: Propineb  
Formula estructural:



UPAC: 1-[(E)-2-cyano-2-methoxyiminoacetyl]-3-ethyurea.  
Fórmula Empírica: C<sub>7</sub>H<sub>10</sub>N<sub>4</sub>O<sub>3</sub>

Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto:  
Envase plástico polietileno de alta densidad y bolsa metálica de aluminio.

A NOMBRE DE: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.  
Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong 262737,  
China.  
Tel.: 86-531-88875222  
Website: www.rainbowchem.com

Importado y distribuido por:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.  
Carrera 11A # 93 A 80. Oficina 305  
Teléfono: 57-1-6235967  
NIT: 900382571 - 7  
Bogotá, D.C.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III  
LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO  
(Franja de color azul pantone)

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

PROPINEB + CYMOXANIL RAINBOW 76 WP es un fungicida protectante y curativo, desarrollado para el control de enfermedades causadas por hongos. Es un fungicida de doble acción, sistémico y de contacto, trabaja sobre la espora y la enfermedad. Su parte sistémica se absorbe rápidamente y no se lava después de una hora de aplicado.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	P.C.	PR
Papa	GOTA (Phytophthora infestans)	1.5 Kg/ha	15 días	4 horas

P.C: Período de carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

PR: Período de reentrada: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: PROPINEB + CYMOXANIL RAINBOW 76 WP se puede aplicar en cualquier estado de desarrollo del cultivo, ofreciendo acción residual prolongada y su amplio espectro de acción.

Protege por fuera y cura por dentro de la hoja, combate la enfermedad antes y después de establecida. No afecta la fotosíntesis por su coloración blanca. Su parte protectante se adhiere mejor a la hoja. No se acumula dentro de la planta, presentando una mejor dispersión en la hoja. En invierno presenta su máxima potencia.

No mezclar con productos a base de calcio.

No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 125 µm aprox.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto -contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

06 MAR 2019

PLAGUICIDA  
DIRECCION TECNICA DE INGENIERIA AGRONOMA



**PROPINEB + CYMOXANIL RAINBOW 76 WP**  
**USO: FUNGICIDA DE USO AGRICOLA**



Nombre Ing. activos:

**Propineb**..... 700 g/Kg

**Cymoxanil**..... 60 g/Kg

Grupo químico: Carbamatos


**Cymoxanil** Cyanoacetamida oxime

Tipo de formulación: Polvo Mojable - WP

No. Registro Nacional ICA: 1382

Nombre químico: **Propineb**

Formula estructural:




IUPAC: *Polymeric zinc propylenebis(dithiocarbamate)*

Formula Empírica: C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>N<sub>2</sub>S<sub>2</sub>Zn

Nombre químico: **Cymoxanil**

Formula estructural:



IUPAC: *1-[(E)-2-cyano-2-methoxyiminoacetyl]-3-ethyurea*.

Formula Empírica: C<sub>7</sub>H<sub>10</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto:

Envase plástico polietileno de alta densidad y bolsa metálica de aluminio.

A NOMBRE DE:

**RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.**

Formulado por:

**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.**

Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong 262737,

China.

Tel.: 86-531-88875222

Webste: www.rainbowchem.com

Importado y distribuido por:

**DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.**

Km 1.5 Via Chia - Cajicá.

Costado Occidental Centro Empresarial OXUS Of. 206

Teléfono: 8622481

gerenciacomercial@delmonteagro.com.co

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA III**  
**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**  
**(Franja de color azul pantone)**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”**

**PROPINEB + CYMOXANIL RAINBOW 76 WP** es un fungicida protectante y curativo, desarrollado para el control de enfermedades causadas por hongos. Es un fungicida de doble acción, sistémico y de contacto, trabaja sobre la espora y la enfermedad. Su parte sistémica se absorbe rápidamente y se lava después de una hora de aplicado.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	P.C.	PR	PERIODO DE REINGRESO
Papa	<i>GOTA (Phytophthora infestans)</i>	1.5 Kg/ha	15 días	4 horas	

**P.C:** Periodo de carencia: Dias que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**PR: Periodo de reentrada:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** **PROPINEB + CYMOXANIL RAINBOW 76 WP** se puede aplicar en cualquier estado de desarrollo del cultivo, ofreciendo acción residual prolongada y su amplio espectro de acción.

Protege por fuera y cura por dentro de la hoja, combate la enfermedad antes y después de establecida. No afecta la fotosíntesis por su coloración blanca. Su parte protectante se adhiere mejor a la hoja. No se acumula dentro de la planta, presentando una mejor dispersión en la hoja. En invierno presenta su máxima potencia.

No mezclar con productos a base de calcio. No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

**EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA** Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 125 µm aprox.

**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:** Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

**INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:**

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

