

LEA DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud: 117 (línea gratuita)
CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Ningún envase que haya contenido el plaguicida debe reusarse.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto en envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora. No permitir animales en la área tratada.

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO



**NUTRIENTE, FORTIFICANTE Y ACTIVADOR DE DEFENSAS
NATURALES DE LAS PLANTAS**

Composición Garantizada:

Carboxylatos expresados como	30.00 g/L
Carbono Orgánico Oxidable total	30.00 g/L
Ácido Orgánico y Carboxylatos Primarios	350.00 g/L
Cobre(Cu)	22.00 g/L
Inertes	858.00 g/L

Distribuido por:



Fabricado por:



Lote N°:

F. Fab:

F. Venc. :

Contenido Neto:

CARACTERÍSTICAS:

AndiCrop Forte es un nutriente , fortificante líquido a base de Extractos Vegetales con Ácidos Orgánicos que activan las defensas naturales de las plantas para prevenir la incidencia de hongos y bacterias que ocasionan diversas enfermedades en los cultivos. **AndiCrop Forte** altera la permeabilidad y el normal funcionamiento del pool enzimático de la pared celular e incentiva el engrosamiento de la cutícula y epidermis para dificultar físicamente la penetración de los patógenos y/o sus vectores. **AndiCrop Forte** es de origen natural por lo que puede ser usado durante la cosecha y tratamiento post-cosecha. **AndiCrop Forte** es un agente antiestresante antioxidante. **AndiCrop Forte** es el complemento ideal de cualquier programa de manejo fitosanitario de enfermedades en cultivos de exportación

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	DÓSIS X/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN
VID	500 mL / 200 L 500 mL / 200 L 500 mL / 200 L	Inicio de punta 14 días después de la primera aplicación. 14 días después de la segunda aplicación.
BANANO	500 mL / 200 L	Desde el inicio del desarrollo vegetativo, con una frecuencia de 14 días entre cada aplicación en post-cosecha, durante el tratamiento de frutos.
MANGO	500 mL / 200 L 500 mL / 200 L 500 mL / 200 L	60, 30 y 10 días antes de la cosecha, para el tratamiento de frutos por inmersión o aspersión.
CÍTRICOS	500 mL / 200 L 500 mL / 200 L 500 mL / 200 L	Inicio de floración (botoneo). Plena Floración. Cuajado de frutos.
ALCACHOFA	500 mL / 200 L	Desde inicio del desarrollo vegetativo, con frecuencia de 14 días entre cada aplicación. En post-cosecha, para el tratamiento de capítulos por inmersión o aspersión.
PALTO	500 mL / 200 L 500 mL / 200 L 500 mL / 200 L 500 mL / 200 L	Inicio de floración. Cuajado de frutos. Desarrollo de frutos. En post-cosecha, para el tratamiento de frutos.

PERIODO DE REINGRESO: Se puede reingresar al área tratada luego de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional.

FITOTOXICIDAD: no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".