

LEA DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud: 117 (línea gratuita)  
CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita)


**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

**NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO**



**PROMOTOR DE CRECIMIENTO VEGETAL  
ALTAMENTE CONCENTRADO EN PROTOCITOQUININA**

**Composición Garantizada:**

Carboxylatos, Ácidos Carboxílicos ..... 730 g/L  
 Extractos de origen vegetal biológicamente activas ..... 500.00 mg/L  
 Protocitoquininas ..... 19.34 g/L  
 Microelementos (Fe, Zn, Mg, Mn, B, S) ..... 200 g/L  
 Inertes ..... 200 g/L

Distribuido por:



Av. Alfredo Benavides N° 2150 - Int. 702  
 Urb. El Rosedal - Miraflores  
 Lima - Perú  
 RUC: 20603105894

Fabricado por:



Calle Los Alamos 863  
 Asociación Valle Hermoso - Puente Piedra  
 Lima, Lima  
 RUC: 20602609155

**Lote N°:**  
**F. Fab:**  
**F. Venc.:**  
**Contenido Neto:**

**CARACTERÍSTICAS:**

**ANDICROP CK-TIN**, actúa a nivel celular estimulando la división y elongación celular. Los Extractos vegetales con efecto bioestimulante es un regulador del crecimiento que tienen como base el extracto de algas vegetales con una alta concentración de protocitoquininas que presenta alta actividad de división celular en los cultivos promoviendo la floración, potenciando el amarre de frutos, el brotamiento de yemas laterales y la producción de frutos con buen calibre, además contiene micronutrientes en forma quelatada que actúan favorablemente en los procesos metabólicos promoviendo la fotosíntesis, regulando el crecimiento vegetativo, induciendo la floración, favoreciendo la calidad de la condición final de los frutos.

**RECOMENDACIONES DE USO:**

CULTIVO	DOSES (ml 200 L)	APLICACIONES
Arándano	500	Cuajado de bayas (4-8 mm). Repetir cada 15 días.
Ajo y Cebolla	500	En los momentos previos a la formación del bulbo (10 a 12 semanas de la siembra)
Ajofa	500	Después de cada corte cuando aparezca el rebrote
Apio	500	De 4 a 6 semanas antes del corte
Brócoli, Coliflor, Repollo, Lechuga (Romana)	500	Al inicio de la formación de cabeza
Caña de Azúcar	1000	Cada vez que se requiera un crecimiento acelerado de la caña.
Cebolla china	500	A los 20 días después del trasplante y 45 días después de la siembra para cebollín, repetir 30 días después
Cereales (trigo, cebada, avena)	500	Al momento de pleno macollamiento. Inicio de encañe y embuche
Cucurbitáceas (Pepino, melón, sandía)	500	Cuando la planta tenga de 3 a 5 hojas verdaderas. Repetir a la formación de cuajis, continuar cada 15 días hasta el último corte
Espárrago	500	En plantaciones nuevas (1ro y 2do año) hacer de 2 a 3 aplicaciones durante el ciclo. Para cultivos de 3 años en adelante hacer dos aplicaciones con intervalos de 30 días entre cada una. La primera cuando la planta tenga 30 cm de altura y la segunda cuando tenga 50 cm de altura
Leguminosas (Frijol, Haba, Palla)	500	Al momento de aparición de los botones florales y repetir de 1 a 3 veces cada 15 días, dependiendo del hábito de crecimiento
Tomate, Aji y Berenjena	500	A la aparición de las flores, repetir cada 2 a 3 semanas hasta la última floración comercial
Papa, Camote y Yuca	500	Al inicio de la tuberización y repetir 15 a 30 días después
Producción de plántulas (Almácigos e invernaderos)	500	A la segunda y tercera semana del desarrollo
Palto, Citrico, Mango y Papaya	500	A la aparición de la floración, repitiendo 30 días después
Vid	500	Racimos visibles (Estado púa) Racimos Separados (Aparición de hombros) Cuajado (en bayas de 4 - 6 mm)
Manzano y Durazno	500	Durazno En puntas plateadas Manzano y puntas verdes Durazno, repetir cuando el fruto tenga de 1 a 2 centímetros de diámetro.

**MOMENTO DE APLICACIÓN:** Para lograr excelentes resultados se recomienda realizar por lo menos 2 aplicaciones con intervalos de 10 a 15 días dependiendo del periodo fenológico del cultivo

**COMPATIBILIDAD:** No debe mezclarse con productos cúpricos. Es compatible con productos de uso común, sin embargo, se recomienda hacer pequeñas pruebas antes de proceder a su mezcla con otros productos

**PERIODO DE REINGRESO:** Se puede ingresar inmediatamente a las áreas tratadas.

**FITOTOXICIDAD:** No causa Fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

**Kressiendo S.A.C.** garantiza la composición y contenido publicada en esta etiqueta siempre y cuando el producto haya sido adquirido en un establecimiento autorizado y el envase de este producto cuente con su sello de seguridad, haya sido almacenado apropiadamente y se utilice antes de su fecha de expiración. **Kressiendo S.A.C.** garantiza la efectividad del producto siempre y cuando se sigan al pie de la letra las indicaciones de uso contenidas en esta etiqueta. Dado que el manejo, transporte, dosificación y aplicación de los productos están fuera de su control, **Kressiendo S.A.C.** no se hace responsable por efectos inesperados obtenidos como consecuencia del mal uso, dosificación equivocada, manejo erróneo o uso de productos expirados o mal conservados.

ÁREA DE PEGADO