

LEA DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud: 117 (línea gratuita)
CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Ningún envase que haya contenido el plaguicida debe reusarse.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto en envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora. No permitir animales en el área tratada.

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO



PROMOTOR DE LLENADO Y MADURACION

Composición Garantizada:

Carboxylatos y extractos vegetales expresados
como Carbono Orgánico Oxidable Total 35.00 g/L
Potasio (K2O) 135.00 g/L

Distribuido por:



Solandina

Av. Alfredo Benavides N° 2975 - Of. 902
Urb. A Von Humboldt - Miraflores
Lima - Perú
RUC 20603105894

Fabricado por:



Calle Los Alamos 863
Asociación Valle Hermoso - Puente Piedra
Lima, Lima
RUC: 20602609155

Lote N°:

F. Fab:

F. Venc. :

Contenido Neto:

CARACTERÍSTICAS:

Los Carboxylatos y Extractos Vegetales de **AndiCrop Potasio** de tipo alifático contenidos en la formulación, favorecen un eficaz flujo del Potasio, a nivel translaminar y por tejidos de conducción hacia los sitios de demanda, provocando una rápida respuesta en calibre, color y maduración de frutos.

MOMENTO DE APLICACIÓN: Es recomendable aplicar en las primeras etapas de formación de frutos.

MODO DE APLICACIÓN: Aplicaciones foliares, puede ser aplicado con cualquier equipo de aspersión.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar con agua el estanque hasta la mitad de agua requerida, agregar dosis de **AndiCrop Potasio** luego completar con la otra mitad de agua requerida y agitar.

RECOMENDACIONES DE USO:

	CULTIVO	DOSIS/ APLICACIÓN	NÚMERO DE APLICACIONES
Frutales	Vid, Mango	2 a 4 L/ha	De 2 a 3 aplicaciones
	Manzano, Peral, Cítricos, Palto, Olivo	2 a 3 L/ha	De 2 a 3 aplicaciones
	Fresa	1 a 3 L/ha	2 aplicaciones
	Banano	2 a 3 L/ha	Cada 6 semanas
	Café	1 a 2 L/ha	De 1 a 2 aplicaciones
Hortalizas	Apio, Acelga, Lechuga, Tomate, Aji, Pimiento, Páprika, Melón, Pepino, Sandía, Zapallo, Brócoli, Coliflor, Col, Cebolla, Ajo, Arveja, Haba, Frijol, Espárrago, Alcachofa	2 a 4 L/ha	De 1 a 2 aplicaciones
	Papa	2 a 3 L/ha	De 2 a 4 aplicaciones
Otros	Trigo, Maíz, Arroz	0.75 a 1 L/ha	De 1 a 2 aplicaciones
	Caña de Azúcar	1.5 a 2 L/ha	De 1 a 2 aplicaciones

PERIODO DE REINGRESO: Se puede reingresar al área tratada luego de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con compuesto cúpricos debido a que puede causar fitotoxicidad. Siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

FITOTOXICIDAD: No existe cuando se aplica en los cultivos y dosis recomendada.

AVISO DE GARANTÍA:

Kressiendo S.A.C. garantiza la composición y contenido publicada en esta etiqueta siempre y cuando el producto haya sido adquirido en un establecimiento autorizado y el envase de este producto cuente con su sello de seguridad, haya sido almacenado apropiadamente y se utilice antes de su fecha de expiración. **Kressiendo S.A.C.** garantiza la efectividad del producto siempre y cuando se sigan al pie de la letra las indicaciones de uso contenidas en esta etiqueta. Dado que el manejo, transporte, dosificación y aplicación de los productos están fuera de su control, **Kressiendo S.A.C.** no se hace responsable por efectos inesperados obtenidos como consecuencia del mal uso, dosificación equivocada, manejo errado o uso de productos expirados o mal conservados.