



FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Propineb700 g/kg
Cymoxanil 60 g/kg
Excipientes c.s.p.....1.0 kg

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Registro Nacional: 55 – F 5 / NA

CONTENIDO NETO: 1 kg

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

P.V.P.:

TITULAR DEL REGISTRO:
SINO-CHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 3-31 entre Versalles y Ulloa, Edificio Villareal Durán Hnos. 2do piso Quito-Ecuador.

Table with 2 columns: Formulado por, Distribuido por. Lists various international and local distributors for Pritopa.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTENGA BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Nocivo en caso de ingestión. Evitar que el producto entre en contacto con piel, ojos y ropa. Puede causar daños a los órganos a través de la exposición prolongada y repetida.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora como camisa manga larga, pantalón largo, botas de caucho, visor, guantes de caucho y mascarilla durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación: Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel: Retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión: No induzca el vómito.

SÍNTOMAS: Pueden incluir dolor de cabeza, palpitaciones, náuseas, vómitos, cara enrojecida, irritación o nariz, garganta, ojos y piel, etc.

TRATAMIENTO MÉDICO Y ANTÍDOTO: Tratamiento esencialmente sintomático. No existe antídoto específico.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta”.



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800-VENENO (836366). Atención 24 horas del día.

SINO-CHEMICAL S.A.: 0992500795

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilicela cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: “Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos”. “Para la aplicación terrestre de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas, respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano”. “Realizar las aplicaciones de manera dirigida al cultivo”. “No emplear este envase para ningún otro fin”.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PRITOPA es una mezcla de dos fungicidas, por un lado, Propineb es clasificado como un fungicida con acción de contacto con propiedades protectantes y actividad residual prolongada. Actividad multisitio. Por otro lado, Cymoxanil es un fungicida foliar con actividad protectante y curativa.

MODO DE EMPLEO:

Para su preparación en un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada con una pequeña cantidad de agua hasta formar una solución homogénea, luego verterla en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar frecuentemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Table with 4 columns: CULTIVO, PLAGA, DOSIS*, PC (Periodo de carencia). Lists application details for Potato and Tomato.

*Volumen de agua: Papa: 600 l/ha; Tomate riñón: 800 l/ha

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Papa: Realizar la aplicación de PRITOPA cuando exista el 2.0% de presencia de lancha en plantas. No se recomienda hacer más de dos aplicaciones con un intervalo de 7 días. Tomate riñón: Realizar dos aplicaciones con un intervalo de 7 días, procurando una buena cobertura de la planta.

PERIODO DE REINGRESO: Se debe esperar por lo menos 12 horas después de la aplicación para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con plaguicidas fuertemente ácidos y alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad a pequeña escala, en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

RESPONSABILIDAD: “El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

