



TANCAP_{80 WG}

FUNGICIDA DE USO AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

Captan.....800 g/kg

N-(trichloromethylthio)cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide

Ingredientes Aditivos:.....c.s.p. 1 kg

Registro Nacional ICA N° 1631

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Formulado por:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW
CHEMICAL CO. Ltd.
Binhai Economic Development Area
Weifang, Shandong 262737, China
Tel: 86-531-88875222

CONTENIDO NETO:

500 gramos

Lote N°:

Fecha de
Formulación:

Fecha de
Vencimiento:



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS
NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO
CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS
EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este fungicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y "No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación".

Durante las aplicaciones terrestres "Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas" además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno o PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para pesticidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón". En caso de inhalación lleve el paciente al aire fresco y manténgalo en reposo. "Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado".

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

PRECAUCIÓN: Puede causar irritación de piel y ojos. Puede ser irritante al sistema respiratorio. Evite respirar polvo, vapor o aspersión del producto. Evite el contacto con la piel, ojos o ropa.

Contacto con los ojos: Lávelos con agua limpia por al menos 15 minutos hasta que la irritación disminuya. Consiga atención médica si la irritación persiste.

Contacto con la piel: Remueva la ropa y zapatos contaminados inmediatamente. Lave fuertemente con agua y jabón la zona afectada. Consiga atención médica.

Inhalación: Utilice equipo de protección respiratoria antes del rescate. Inmediatamente traslade la víctima a un lugar con aire fresco. Si la víctima no respira de respiración artificial; si respira dificultosamente, suminístrele oxígeno. Consiga atención médica.

Ingestión: De a beber dos vasos de agua e induzca el vómito tocando la parte posterior de la garganta. Nunca induzca el vómito ni suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Busque atención médica.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000 916012 fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el teléfono 57-1-288 6012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

"Respetar las franjas de seguridad con relación a los cuerpos de agua"
"Extremadamente tóxico para organismos acuáticos"

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación de **TANCAP 80 WG**, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con **TANCAP 80 WG**, las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 a 100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacene el producto en sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de aprobación ICA: 13/06/2018

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

TANCAP 80 WG es un fungicida no sistémico que actúa por contacto, con acción preventiva. Fungicida de amplio espectro con actividad preventiva, es absorbido por vía radicular y foliar.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Inhibición de la respiración celular de las esporas de los patógenos. Actúa inhibiendo la germinación de las esporas, dificultando el crecimiento y desarrollo del micelio. Es Granulado dispersable en agua para aplicar en pulverización. La presentación facilita tanto el manejo del producto como la obtención del caldo fungicida. Puede ser utilizado en el control preventivo de las enfermedades.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C.	P.R.
TOMATE	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	750 g/ha	7 días	12 horas
PAPA	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	900 g/ha		

P.C.: Periodo de carencia: Intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Periodo de reentrada: *Periodo de reentrada REI: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado. En caso de ser necesario el ingreso antes del tiempo determinado como periodo de reentrada, se debe usar pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado y para las labores que impliquen contacto de las manos con el área tratada, se debe usar adicionalmente guantes.*

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar preventivamente con el inicio de los primeros síntomas cuando las condiciones ambientales favorezcan la enfermedad.

Aplicar dentro de un programa de manejo integrado -MIP- (rotando con otros plaguicidas de diferente modo de acción o grupo químico) para evitar el desarrollo de la resistencia.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

TANCAP 80 WG puede ser aplicado en equipos aspersores autopropulsados y/o acoplados a tractor, en equipos aéreos y también utilizando fumigadoras montadas en bestia o del tipo de espalda. Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. En el cultivo de papa se recomienda 600 litros de agua/ha. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aproximadamente.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No es fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

