

LEA COMPLETAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

“NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”
 “MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS”
 “CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS”

IMAZETAPIR RAINBOW 100 SL no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y “**No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación**”.

Durante las aplicaciones terrestres “**Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación**” además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos y máscara especial para herbicidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

“**Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón**”, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

“**Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado**”.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

“**En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta**”.

- **Si el producto fue ingerido:** Facilite y despeje las vías respiratorias. Lavar inmediatamente la boca y buscar ayuda médica. No provocar nunca el vómito o suministrar algo por la boca, cuando la persona afectada está inconsciente.
- **Si el producto fue inhalado:** Retire al paciente del área contaminada, busque atención médica inmediata.
- **Si hubo contacto con la piel:** Bañar al paciente con abundante agua corriente y jabón. Cambiarlo de ropa manteniéndolo en reposo y abrigado
- **Si el producto cayó en los ojos:** Lavar por 15 minutos con abundante agua corriente levantando el párpado superior e inferior en forma periódica. Busque atención médica inmediata.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: “Extremadamente toxico para organismos acuáticos”
 “No contamine fuentes de agua” “Altamente toxico para abejas” “Puede matar abejas y polinizadores” “No aplicar en presencia de abejas o en época de floración del cultivo” “No aplicar en horas de alta actividad de abejas”

En caso de derrame, recoja y deseché acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación de **IMAZETAPIR RAINBOW 100 SL**, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado. Evite contaminar con **IMAZETAPIR RAINBOW 100 SL** las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras, troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación y o cualquier otra área que requiera protección.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su envase original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de Aprobación ICA: 14/08/2020

HERBICIDA AGRÍCOLA



CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**Ingrediente activo:**

Imazetapyr,..... 100 g/L

5-ethyl-2-[(RS)-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]nicotinic acid de formulación a 20 °C

Ingredientes aditivos..... c.s.p. 1 L

Registro Nacional ICA No. 1683

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCIAS S.A.S.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulador por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222 | Fax: 86-531-88875232

www.rainbowchem.com

1L

CONTENIDO NETO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

IMAZETAPIR RAINBOW 100 SL es un herbicida selectivo y sistémico, perteneciente a la familia de las imidazolinonas. Es absorbido por follaje y raíces; inhibe las enzimas AHAS, interrumpe la síntesis de proteínas, interfiere la síntesis de ADN e inhibe el crecimiento celular. La muerte de las malezas puede demorar 3 a 4 semanas. Además de controlar las malezas provee control residual de malezas susceptibles que germinen después de la aplicación.

CULTIVO	MALEZAS QUE CONTROLA	DOSIS	P.C	P.R
Frijol	Helecho (<i>Pteridium aquilinum</i>) Gualola (<i>Polygonum segetum</i>) Verónica (<i>Aparécida Verónica pérsica</i>) Vira vira (<i>Ganaphallium spicatum</i>) Sangre de toro (<i>Rumex acetosella</i>) Kikuyo (<i>Pennisetum clandestinum</i>)	0.45 L/HA El suelo debe estar húmedo. Aplicar una sola vez por ciclo de cultivo	N.A.	0 horas

P.C: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Periodo de reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado.

N.A: No Aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Para un buen control de **IMAZETAPIR RAINBOW 100 SL** es necesario observar que las condiciones de humedad sean adecuadas. Realice la aplicación en preemergencia total del cultivo y en malezas en preemergencia/post-emergencia temprana (hasta 3 hojas). En periodos prolongados de sequía no se recomienda su aplicación. No se aplique cuando haya vientos fuertes, para evitar daños en cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Calibre bien los equipos y asegure un tamaño y distribución de gotas uniforme. Se recomienda aplicar con boquillas de abanico plano a una presión de 40 a 50 psi.

Al aire libre, diluir la dosis del producto en la mitad del volumen de agua, haciendo un triple lavado del envase. Completar el volumen con agua agitando constantemente hasta obtener una mezcla homogénea. Para aplicación terrestre utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: **IMAZETAPIR RAINBOW 100 SL** utilizado siguiendo las recomendaciones técnicas enunciadas, es seguro para el cultivo del frijol. Se recomienda, sin embargo, bajo responsabilidad del usuario, que en casos de mezclas de tanque con otros plaguicidas, se realice previamente una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad, observando las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación, para determinar los aspectos físicos y las reacciones a efectos fitotóxicos.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL: “El Titular del Registro garantiza que las características fisico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

